Human papillomavirüs (HPV) pozitif kadın hastada papillom benzeri lezyonda vokal kord polibi tanısı: Olgu sunumu

Sultan Okudan[1], Şeyma Delibaş[1], Makbule Neslişah Tan[1]
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye



Amaç: Ses kısıklığı ve papillom benzeri lezyonla başvuran bir hastada, HPV pozitifliği nedeniyle malignite şüphesi oluşmuş; ancak ileri değerlendirme sonucunda benign vokal kord polibi tanısı almıştır. Bu olgu sunumunun amacı, benign vokal kord lezyonlarının klinik ve endoskopik görünüm itibariyle maligniteyi taklit edebileceğini vurgulamak, HPV enfeksiyonu ve sigara gibi risk faktörlerinin klinik şüpheyi nasıl artırabileceğini ortaya koymak ve bu tür vakalarda doğru tanıya ulaşmak için histopatolojik incelemenin gerekliliğini aile hekimliği pratiği bağlamında hatırlatmaktır.

Yöntem: Olgu sunumu şeklinde hazırlanan bu çalışmada, hastanın başvuru şikâyetleri, anamnezi, fizik muayene bulguları, laboratuvar sonuçları ve görüntüleme bulguları doğrultusunda yapılan değerlendirme ile yönlendirildiği uzmanlık alanındaki ileri tetkik ve histopatolojik sonuçları ayrıntılı şekilde sunulmuştur.

Bulgular: 35 yaşındaki kadın hasta, yaklaşık bir yıldır süren ses kısıklığı ve yutma güçlüğü nedeniyle aile hekimliği polikliniğimize başvurdu. Anamnezinde dış merkezde kronik servisit ve servikal intraepitelyal neoplazi derece 1 (CIN 1) tanısıyla izlemde olduğu; HPV tiplemesi sonucunda HPV 16 ve 18 negatif, fakat diğer yüksek riskli tiplerin pozitif saptandığı görüldü. Yaklaşık 15 paket/yıl sigara kullanım öyküsü bulunduğu öğrenildi. Fizik muayenede uvula ucunda papillom benzeri bir lezyon tespit edildi. Malignite şüphesiyle kulak burun boğaz polikliniğine yönlendirildi. KBB tarafından yapılan laringoskopide her iki vokal kordda Reinke ödemi ve sol vokal kord orta 1/3'lük alanda lökoplaki gözlendi. Biyopsi patolojisi sonucunda, beklenenin aksine malignite saptanmadı. Lezyonun vokal kord polibi ile uyumlu benign özellikte olduğu belirtildi. HPV pozitifliği, lökoplaki ve Reinke ödemi gibi risk faktörleri nedeniyle başlangıçta malignite açısından şüpheli kabul edilen bu lezyonun aslında iyi huylu bir vokal kord polibi olduğu ortaya kondu.



Sonuç: Patolojik incelemelerde benign vokal kord lezyonları içerisinde en önemli grubu vokal kord polipleri oluşturmaktadır. Bu olgu, benign vokal kord polibinin klinik olarak maligniteyi taklit edebileceğini göstermektedir. HPV enfeksiyonu ve sigara kullanımı gibi risk faktörleri, bu tür lezyonların değerlendirilmesinde dikkatle ele alınmalıdır. Aile hekimliği pratiğinde ses kısıklığı gibi başvuru nedenlerinin etiyolojisi iyi huylu görünüyor olsa dahi özellikle eşlik eden risk faktörleri mevcutsa; ileri tetkik ve gerektiğinde ilgili uzmana yönlendirme yapılması kritik önem taşımaktadır. Bu yaklaşım olası maligniteleri erken tanınmasını ve tedavi gecikmelerinin önüne geçilmesini sağlar.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sultan OKUDAN
Araştırma Görevlisi ,Aile Hekimliği Anabilim Dalı
İzmir, Türkiye

sultankaya12@gmail.com
sultan.kaya@deu.edu.tr