Tıp ve hemşirelik fakültesi öğrencileri HIV enfeksiyonunun ne kadar farkındalar?

Ceylan Avcı[1], Kazım Burak Kazımoğlu[2], Cemre Su Yıldırım[2], İlkay Karaca[2], Ege Kırte[2], Pelinsu Yağcı[2], Arzu Nazlı[3]
[1]Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
[2]Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf
[3]Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Tıp ve hemşirelik fakültesi öğrencileri yaşlarından dolayı HIV enfeksiyonu açısından risk grubundadır. Bu çalışmada öğrencilerinin HIV enfeksiyonu ile ilgili bilgi düzeylerinin ve cinsel davranışlarının ve öz bildirimde bulundukları cinsel yolla bulaşan hastalıkların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmaya, 1., 4. ve 5. sınıflarda okuyan tıp fakültesi öğrencileri ile 1. ve 4. sınıflarda okuyan hemşirelik fakültesi öğrencileri dahil edildi. Katılımcılara, sınıf ortamında Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Bilgi Ölçeği' (CYBHB-Ö) ve 'Cinsellik ve Cinsel Davranış Formu' uygulandı.
Bulgular: Araştırmaya,280 öğrenci (tıp fakültesi: 213, hemşirelik fakültesi: 67) olmak katıldı. Öğrencilerin yaş ortalaması 20± 1,9 yıl olup %43,9'u kadın, %56,1'i erkekti. Öğrencilerin %43,6'sı cinsel birlikteliğinin olduğunu, %35,7'si oral seks, %13,6'sı anal seks deneyimi olduğunu, %30,7'si aktif bir partneri olduğunu, partneri olanların %52,3'ü kondom kullandığını belirtti. Öz bildirimle kadınların %22'si (27/123) servisit, erkeklerin %7'si (11/157) üretrit semptomları gösterdiğini belirtti. Katılımcıların %1,8'i (5/280) siğil, %1,1'i (3/280) genital uçuk tanısı aldıklarını bildirdi. Ölçekteki HIV enfeksiyonu ile ilgili maddelere vermiş oldukları cevaplar Tablo 1'de verilmiştir.
Sonuç: Öğrencilerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından riskli grupta olduğu, ancak kondom kullanımının düşük olduğu, HIV ile ilgili farkındalıklarının düşük olduğu görülmüştür. Tıp ve hemşirelik fakültesi öğrencilerinin hem kişisel olarak kendilerini korumaları hem de mesleki anlamda yeterli olmaları için erken dönemde ve etkili eğitim faaliyetlerinin gerekli olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: HIV/AIDS, cinsel yolla bulaşan hastalıklar bilgi ölçeği, cinsel davranışlar formu, tıp öğrencileri, hemşirelik öğrencileri

Tablo 1. HIV enfeksiyonu ile ilgili maddelere verilen doğru ve yanlış cevap oranları

Madde	Doğru cevap verenler n,%	Yanlış cevap verenler n,%
Prezervatif (kondom) kullanmak, bir kişiyi HIV bulaşmasına karşı koruyabilir.	215, %76,8	65, %23
İnsan papilloma virüs (HPV) sebebi HIV'i (AIDS) meydana getiren virüs ile aynıdır.	168, %60	112, %40
Genital uçuğun sebebi HIV'i (AIDS) meydana getiren virüs ile aynıdır.	146, %52,1	134, %48
Eğer bir kişinin HIV testi pozitif ise o test aynı zamanda kişinin ne derecede hasta olduğunu da gösterebilir.	144, %51,4	136, %48,6
Bir kişinin cinsel yolla bulaşan herhangi bir hastalığı varsa HIV'e (AIDS) yakalanması daha kolaydır.	128, %45,7	152, %54,3
İnsan papilloma virüs (HPV) HIV'e (AIDS) neden olabilir.	121, %43,2	159, %56,8
HIV (AIDS) enfeksiyonundan kısa süre sonra bireylerin cinsel organlarında (penis ya da vajina) açık yaralar meydana gelir.	113, %40,4	167, %59,6